

Profil des nourrissons sous Nutramigen* PURAMINO*

Résultats préliminaires de 67 nourrissons inclus dans une enquête observationnelle (2025-2026)



Population de l'étude#

Age (mois) ▶ **2,9**

Poids (kg) ▶ **5,3**

Taille (cm) ▶ **58,2**

IMC (kg/m²) ▶ **15,5**

6 enfants sur 10 présentent des antécédents familiaux d'allergie

Manifestations cutanées



Manifestations respiratoires et ORL



Manifestations gastro-intestinales



■ Parents ■ Fratrie ■ Grands-Parents ■ Oncles & Tantes

Alimentation avant Nutramigen* PURAMINO*

- Allaitement maternel : **16%**
- Allaitement mixte : **12%**
- Lait 1er âge : **32%**
- Hydrolysât poussé de protéines de lait de vache ou de protéines de riz : **33%**

Diagnostics et terrains

APLV de forme non IgE-médiée

92%

Stagnation staturo-pondérale[‡]

30%

Atteinte de la sphère digestive

97%

Symptômes observés lors du diagnostic

RGO

73%

Coliques / inconfort

69%

Diarrhée

50%

Vomissements

43%

Eczéma

42%

Sécheresse cutanée

34%

En moyenne

‡ Résultats pour 14/67 enfants




Evolution staturo-pondérale des enfants sous Nutramigen* PURAMINO*

16 semaines $\pm$ 4 semaines entre les 2 visites

	Age (mois)	Poids (kg)	Taille (cm)	IMC (kg/m ²)	Stagnation staturo-pondérale ^μ
Visite 1	2,9	5,3	58,2	15,5	30%
Visite 2	6,7	8,0	68,1	17,3	2%


Rattrapage staturo-pondéral

Poids selon l'âge – Evolution des z-scores selon les standards OMS (0-24 mois)



73% d'amélioration sur l'ensemble des symptômes cliniques

Evolution des symptômes entre les 2 visites (%)



^μ Résultats pour 14/67 enfants.

^μ Différence de z-score de +0,5, le seuil de rattrapage pondéral cliniquement significatif